



Retratos de actores.

Qué esperar con EPKINLY

Una guía de tratamiento

¿Qué es EPKINLY?

EPKINLY es un medicamento de venta con receta que se utiliza para tratar a adultos con:

- linfoma folicular (follicular lymphoma, FL) que ha reaparecido o no ha respondido al tratamiento previo, junto con lenalidomide y rituximab
- linfoma folicular (FL) que ha reaparecido o no ha respondido después de 2 o más tratamientos.

Se desconoce si EPKINLY es seguro y eficaz en niños.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD ESPECÍFICA

EPKINLY puede causar efectos secundarios graves, entre ellos:

- **Síndrome de liberación de citocinas (SLC)**, que es frecuente durante el tratamiento con EPKINLY y puede ser grave o provocar la muerte.
- **Problemas neurológicos**, que pueden ser graves y potencialmente mortales, y provocar la muerte.
- **Infecciones y recuentos bajos de células sanguíneas.**

Consulte la Información importante de seguridad adicional, incluidas las Advertencias importantes sobre el SLC y los problemas neurológicos, en las páginas 8-9.

Consulte la [Guía del medicamento](#).

¿Qué contiene esta guía?

Bienvenido a EPKINLY 3

Acerca de EPKINLY 4

Qué hacer antes del tratamiento 5

Información importante de seguridad 8

Qué esperar durante el tratamiento 10

Qué hacer después del tratamiento 13

Recursos 15

Seguimiento del tratamiento 18

Calendario de citas 24



Consejo para los socios de atención: Lea esta guía con su ser querido para poder planificar juntos y obtener el máximo beneficio de su tratamiento con EPKINLY.

Consulte la Información importante de seguridad, incluidas las Advertencias importantes sobre el SLC y los problemas neurológicos, en las páginas 8-9. Consulte la Guía del medicamento.





Bienvenido a EPKINLY

Iniciar un nuevo tratamiento puede generar muchas preguntas. Esta guía está diseñada para ayudarlos a usted y a su socio de atención a saber qué esperar antes, durante y después del tratamiento con EPKINLY.

- Use las pestañas o el índice para encontrar fácilmente lo que busca
- Use el formulario de la página 38 para hacer un seguimiento del equipo encargado de su tratamiento
- Recuerde descargar e imprimir dos tarjetas de bolsillo (una para usted y otra para su socio de atención)

Escanee el código QR o visite EPKINLY.com/2L-FL para obtener más información



Consulte la Información importante de seguridad, incluidas las Advertencias importantes sobre el SLC y los problemas neurológicos, en las páginas 8-9. Consulte la [Guía del medicamento](#).

epkinly[®]
epcoritamab-bysp
SUBCUTANEOUS INJECTION 4mg/48mg



Acerca de EPKINLY

EPKINLY está aprobado con R² para tratar a adultos con FL que ha reaparecido o no ha respondido después de al menos 1 tratamiento. EPKINLY se administrará con otros 2 medicamentos: lenalidomide y rituximab, que se conocen comúnmente como R² o “R al cuadrado”.



EPKINLY es un tratamiento con anticuerpos biespecíficos que aprovecha el poder de su propio sistema inmunitario para ayudar a combatir el cáncer



No es quimioterapia ni una terapia con células madre



Puede recibir EPKINLY y R² en el consultorio de su oncólogo

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD ESPECÍFICA

Advertencias importantes: EPKINLY puede causar efectos secundarios graves, entre ellos:

- **Síndrome de liberación de citocinas (SLC)**, que es frecuente durante el tratamiento con EPKINLY y puede ser grave o provocar la muerte. Para ayudar a reducir el riesgo de SLC, recibirá EPKINLY en un cronograma de administración de dosis escalonada (cuando recibe 3 dosis escalonadas menores de EPKINLY antes de su primera dosis completa durante el primer ciclo de tratamiento) y también puede recibir otros medicamentos antes y durante 3 días después de recibir EPKINLY. Su primera dosis completa de EPKINLY se le administrará el día 22 de su primer ciclo de tratamiento. Si su dosis de EPKINLY se demora por cualquier motivo, es posible que tenga que repetir el cronograma de administración de dosis escalonada.

Consulte la Información importante de seguridad adicional, incluidas las Advertencias importantes sobre el SLC y los problemas neurológicos, en las páginas 8-9. Consulte la [Guía del medicamento](#).


epcoritamab-bysp[®]
SUBCUTANEOUS INJECTION 4mg/48mg

¿Con qué frecuencia recibirá EPKINLY?

Cronograma de dosis de EPKINLY y R²

	 EPKINLY (Inyección)	 Rituximab (Infusión)	 Lenalidomide (Comprimido)
Semanas 1-4	Semanal*	Semanal	Diario (durante los primeros 21 días de cada mes)
Semanas 5-12	Semanal	Cada 4 semanas	
Semanas 13-20	Cada 4 semanas		
Semanas 21-48		No administrado	

La administración de dosis escalonada está diseñada para ayudarle a adaptarse al tratamiento con EPKINLY de manera segura debido al riesgo de SLC

- *Durante las primeras 3 semanas de tratamiento, recibirá dosis “escalonadas” de EPKINLY menores que las que recibirá en la semana 4 y durante el resto del tratamiento.
- Antes y durante los 3 días después de cada dosis de EPKINLY en las primeras 4 semanas de tratamiento, recibirá otros medicamentos para ayudarle a reducir el riesgo de síndrome de liberación de citocinas (SLC). Su proveedor de atención médica decidirá si necesita recibir medicamentos para ayudar a reducir su riesgo de SLC en las dosis posteriores de EPKINLY
- Su proveedor de atención médica decidirá si debe ser hospitalizado después de recibir su primera dosis completa de EPKINLY debido a su riesgo de SLC y problemas neurológicos
- Es posible que experimente efectos secundarios durante el tratamiento. Su proveedor de atención médica lo controlará para detectar síntomas de SLC, problemas neurológicos, infecciones y recuentos bajos de células sanguíneas. Se puede interrumpir su tratamiento temporalmente o detenerlo por completo si desarrolla determinados efectos secundarios
- Si su dosis de EPKINLY se demora por cualquier motivo, es posible que tenga que repetir el cronograma de administración de dosis escalonada



Completar el tratamiento de aproximadamente 11 meses con EPKINLY y R² puede ayudarle a vivir sin que se agrave el FL

- Su tratamiento podría demorarse o detenerse si desarrolla determinados efectos secundarios

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD ESPECÍFICA

Advertencias importantes: EPKINLY puede causar efectos secundarios graves, entre ellos:

- **Problemas neurológicos**, que pueden ser graves y potencialmente mortales, y provocar la muerte. Pueden producirse problemas neurológicos días o semanas después de recibir EPKINLY.

Consulte la Información importante de seguridad adicional, incluidas las Advertencias importantes sobre el SLC y los problemas neurológicos, en las páginas 8-9. Consulte la Guía del medicamento.

epkinly[®]
epcoritamab-bysp
SUBCUTANEOUS INJECTION 4mg/48mg

Qué hacer antes del tratamiento con EPKINLY

Hay algunas cosas útiles que debe saber antes de su visita. Su proveedor de atención médica también puede tener instrucciones adicionales.



Hidratación

Es importante que tome mucha agua antes de recibir la inyección de EPKINLY.

Empiece a beber mucha agua el día anterior a su visita. Considere llevar agua a su visita.



Lugar de inyección

Es probable que su inyección de EPKINLY esté en la parte inferior del abdomen o en el muslo.

- Lleve ropa holgada que sea fácil de cambiar
- Tenga preparada una compresa fría en su congelador por si se produce alguna reacción en el lugar de inyección después del tratamiento



Su proveedor de atención médica puede recibir EPKINLY de una farmacia especializada, dependiendo de su seguro médico. Pregunte a su proveedor de atención médica cómo este recibirá su tratamiento. Puede recibir una llamada de la farmacia a través de un número 1-800 para cobrar cualquier copago o coseguro.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD ESPECÍFICA

Es posible que las **personas con FL** sean hospitalizadas después de recibir su primera dosis completa de EPKINLY el día 22 del ciclo 1 debido al riesgo de SLC y problemas neurológicos.

Informe de inmediato a su proveedor de atención médica o busque ayuda médica si tiene fiebre de 100.4 °F (38 °C) o más; mareos o aturdimiento; dificultad para respirar; escalofríos; taquicardia; sensación de ansiedad; dolor de cabeza; confusión; temblores (estremecimientos); problemas con el equilibrio y el movimiento, como dificultad para caminar; dificultad para hablar o para escribir; confusión y desorientación; somnolencia, cansancio o falta de energía; debilidad muscular; convulsiones; o pérdida de memoria. **Estos pueden ser síntomas de SLC o problemas neurológicos.** Si presenta cualquier síntoma que altere la consciencia, **no** conduzca ni use maquinaria pesada ni realice otras actividades peligrosas hasta que los síntomas desaparezcan.

Consulte la Información importante de seguridad adicional, incluidas las Advertencias importantes sobre el SLC y los problemas neurológicos, en las páginas 8-9. Consulte la [Guía del medicamento](#).


epcoritamab-bysp[®]
SUBCUTANEOUS INJECTION 4mg/48mg

Planifique su día de tratamiento

¿Qué debo preguntar?

Antes de su cita para su tratamiento con EPKINLY, consulte a continuación las preguntas sugeridas para hacer a su proveedor de atención médica para ayudarlo a planificar y prepararse.

¿Qué tengo que preparar para mi visita?

¿A dónde debo acudir para el tratamiento?

¿Qué debo saber sobre cómo recibiré lenalidomide y rituximab?

¿Recibiré EPKINLY y rituximab en la misma visita?

¿Necesitaré que mi socio de atención me lleve y me traiga de las visitas en las que me administren la inyección?

¿Cuánto durará mi visita? ¿Podré irme a casa justo después del tratamiento?

Consulte la Información importante de seguridad, incluidas las Advertencias importantes sobre el SLC y los problemas neurológicos, en las páginas 8-9. Consulte la Guía del medicamento.

Información importante de seguridad

¿Qué es EPKINLY?

EPKINLY es un medicamento de venta con receta que se utiliza para tratar a adultos con:

- linfoma folicular (FL) que ha reaparecido o no ha respondido al tratamiento previo, junto con lenalidomide y rituximab
- linfoma folicular (FL) que ha reaparecido o no ha respondido después de 2 o más tratamientos.

Se desconoce si EPKINLY es seguro y eficaz en niños.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Advertencias importantes: EPKINLY puede causar efectos secundarios graves, entre ellos:

- **Síndrome de liberación de citocinas (SLC)**, que es frecuente durante el tratamiento con EPKINLY y puede ser grave o provocar la muerte. Para ayudar a reducir el riesgo de SLC, recibirá EPKINLY en un cronograma de administración de dosis escalonada (cuando recibe 3 dosis escalonadas menores de EPKINLY antes de su primera dosis completa durante el primer ciclo de tratamiento) y también puede recibir otros medicamentos antes y durante 3 días después de recibir EPKINLY. Su primera dosis completa de EPKINLY se le administrará el día 22 de su primer ciclo de tratamiento. Si su dosis de EPKINLY se demora por cualquier motivo, es posible que tenga que repetir el cronograma de administración de dosis escalonada.
- **Problemas neurológicos**, que pueden ser graves y potencialmente mortales, y provocar la muerte. Pueden producirse problemas neurológicos días o semanas después de recibir EPKINLY.

Es posible que las **personas con FL** sean hospitalizadas después de recibir su primera dosis completa de EPKINLY el día 22 del ciclo 1 debido al riesgo de SLC y problemas neurológicos.

Informe de inmediato a su proveedor de atención médica o busque ayuda médica si tiene fiebre de 100.4 °F (38 °C) o más; mareos o aturdimiento; dificultad para respirar; escalofríos; taquicardia; sensación de ansiedad; dolor de cabeza; confusión; temblores (estremecimientos); problemas con el equilibrio y el movimiento, como dificultad para caminar; dificultad para hablar o para escribir; confusión y desorientación; somnolencia, cansancio o falta de energía; debilidad muscular; convulsiones; o pérdida de memoria. **Estos pueden ser síntomas de SLC o problemas neurológicos.** Si presenta cualquier síntoma que altere la consciencia, **no** conduzca ni use maquinaria pesada ni realice otras actividades peligrosas hasta que los síntomas desaparezcan.

EPKINLY puede causar otros efectos secundarios graves, entre ellos:

- **Infecciones**, que pueden provocar la muerte. Su proveedor de atención médica lo controlará para detectar signos y síntomas de infección antes y durante el tratamiento, y lo tratará según sea necesario si desarrolla una infección. Debe recibir medicamentos de su proveedor de atención médica antes de iniciar el tratamiento para ayudar a prevenir infecciones. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si desarrolla algún síntoma de infección durante el tratamiento, incluida fiebre de 100.4 °F (38 °C) o más, tos, dolor torácico, cansancio, falta de aliento, erupción dolorosa, dolor de garganta, dolor al orinar, sensación de debilidad o malestar general, o confusión.
- **Recuentos bajos de células sanguíneas**, que pueden ser graves o intensos. Su proveedor de atención médica controlará sus recuentos sanguíneos durante el tratamiento. EPKINLY puede causar recuentos bajos de células sanguíneas, incluidos niveles bajos de glóbulos blancos (neutropenia y linfopenia), lo que puede aumentar su riesgo de infección; niveles bajos de glóbulos rojos (anemia), que pueden causar cansancio y falta de aliento; y niveles bajos de plaquetas (trombocitopenia), que pueden causar hematomas o problemas hemorrágicos.

Consulte la Información de seguridad importante adicional en la página 9. Consulte la [Guía del medicamento](#).


epkinly[®]
epcoritamab-bysp
SUBCUTANEOUS INJECTION 4mg/48mg

Información importante de seguridad (cont.)

Su proveedor de atención médica lo controlará para detectar síntomas de SLC, problemas neurológicos, infecciones y recuentos bajos de células sanguíneas durante el tratamiento con EPKINLY. Su proveedor de atención médica puede interrumpir temporalmente o detener por completo su tratamiento con EPKINLY si desarrolla determinados efectos secundarios.

Antes de recibir EPKINLY, informe a su proveedor de atención médica acerca de todas sus afecciones médicas, incluido si tiene una infección, está embarazada o planifica quedar embarazada, está amamantando o planifica amamantar. Si recibe EPKINLY durante el embarazo, podría dañar al feto. **Si es una mujer que puede quedar embarazada,** su proveedor de atención médica debe hacerle una prueba para la detección del embarazo antes de que comience el tratamiento con EPKINLY, y usted debe usar un método anticonceptivo (anticoncepción) eficaz durante el tratamiento y hasta 4 meses después de la última dosis de EPKINLY. Informe a su proveedor de atención médica si queda embarazada o cree que puede estar embarazada durante el tratamiento con EPKINLY. No debe amamantar durante el tratamiento con EPKINLY ni en los 4 meses posteriores a su última dosis de EPKINLY.

Entre los efectos secundarios más frecuentes de EPKINLY cuando se usa solo en el FL se encuentran el SLC, las reacciones en el lugar de inyección, el cansancio, el dolor muscular y óseo, la fiebre, la diarrea, el COVID-19, la erupción y el dolor en la zona del estómago (abdominal). **Los resultados anómalos graves más frecuentes en los análisis de laboratorio con EPKINLY cuando se usa solo** incluyen disminución de los glóbulos blancos, disminución de los glóbulos rojos y disminución de las plaquetas.

Entre los efectos secundarios más frecuentes de EPKINLY cuando se usa junto con lenalidomide y rituximab en el FL se encuentran la erupción, las infecciones de las vías respiratorias superiores, el cansancio, las reacciones en el lugar de inyección, el estreñimiento, la diarrea,

Consulte la Información importante de seguridad adicional, incluidas las advertencias importantes sobre el SLC y los problemas neurológicos, en la página 8. Consulte la [Guía del medicamento](#).



el SLC, la neumonía, el COVID-19 y la fiebre. **Los resultados anómalos graves más frecuentes en los análisis de laboratorio con EPKINLY cuando se usa junto con lenalidomide y rituximab** incluyen disminución de los glóbulos blancos y disminución de las plaquetas.

Estos no son todos los efectos secundarios posibles de EPKINLY. Llame a su médico para recibir asesoría médica acerca de los efectos secundarios. Se le recomienda informar los efectos secundarios a la FDA al (800) FDA-1088 o a www.fda.gov/medwatch o a Genmab US, Inc. al 1-855-4GENMAB (1-855-443-6622).


epkinly[®]
epcoritamab-bysp
SUBCUTANEOUS INJECTION 4mg/48mg

Acerca de su inyección de EPKINLY


Antes de que su proveedor de atención médica le administre la inyección de EPKINLY, este:

- Comprobará sus signos vitales (temperatura, presión arterial, ritmo cardíaco) y le hará algunas preguntas sobre su estado de salud general
- Comprobará que esté bien hidratado

Antes de cada dosis de EPKINLY en las primeras 4 semanas, recibirá medicamentos entre 30 y 120 minutos antes de la inyección para ayudar a reducir el riesgo de SLC y, además, recibirá medicamentos durante 3 días después de cada dosis. Su proveedor de atención médica decidirá si necesita recibir medicamentos para ayudar a reducir su riesgo de SLC con futuras dosis.

Durante la inyección

- Se le administrará EPKINLY en forma de inyección debajo la piel (inyección subcutánea), normalmente en la parte inferior de la zona del estómago (abdomen) o en el muslo
- Es probable que su proveedor de atención médica cambie el lugar de inyección en cada visita (de izquierda a derecha o viceversa), especialmente durante las primeras semanas de tratamiento
- Es posible que su equipo de atención médica le pida que permanezca más tiempo después de la inyección para que puedan controlar cualquier reacción
- Su proveedor de atención médica decidirá si debe ser hospitalizado después de recibir su primera dosis completa de EPKINLY debido a su riesgo de SLC y problemas neurológicos



Lleve un registro de los lugares de inyección con el Seguimiento del tratamiento de la página 18.



Consejos para el socio de atención:

- Use una compresa fría para aliviar cualquier reacción en el lugar de inyección relacionada con el tratamiento con EPKINLY
- Asegúrese de que sus preparativos de transporte puedan adaptarse a una estancia más larga después de la inyección si el equipo de atención médica lo solicita

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD ESPECÍFICA

EPKINLY puede causar efectos secundarios graves, entre ellos:

- **Síndrome de liberación de citocinas (SLC)**, que es frecuente durante el tratamiento con EPKINLY y puede ser grave o provocar la muerte.
- **Problemas neurológicos**, que pueden ser graves y potencialmente mortales, y provocar la muerte.
- **Infecciones y recuentos bajos de células sanguíneas.**

Consulte la Información importante de seguridad, incluidas las Advertencias importantes sobre el SLC y los problemas neurológicos, en las páginas 8-9. Consulte la [Guía del medicamento](#).

epkinly[®]
epcoritamab-bysp
SUBCUTANEOUS INJECTION 4mg/48mg



Aprobado solo para adultos.

Preguntas y notas

Seguimiento con su equipo de atención médica

Durante su primera visita del tratamiento con EPKINLY, considere analizar lo siguiente con su equipo de atención médica:

¿Qué debo hacer si omito una dosis?

¿Hay algo que deba tener en cuenta mientras recibo EPKINLY con lenalidomide y rituximab?

¿Puedo hacer algo para mejorar mi salud general durante el tratamiento?

Consulte la Información importante de seguridad, incluidas las Advertencias importantes sobre el SLC y los problemas neurológicos, en las páginas 8-9. Consulte la Guía del medicamento.


epcoritamab-bysp[®]
SUBCUTANEOUS INJECTION 4mg/48mg

Preguntas y notas

Anote las preguntas que pueda tener antes o durante su cita con su proveedor de atención médica. También puede utilizar este espacio para tomar notas.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Consulte la Información importante de seguridad, incluidas las Advertencias importantes sobre el SLC y los problemas neurológicos, en las páginas 8-9. Consulte la Guía del medicamento.

Qué hacer entre tratamientos

Después de que reciba una dosis de EPKINLY, su proveedor de atención médica lo controlará para detectar cualquier efecto secundario del tratamiento, y usted también debe estar atento a los efectos secundarios y a cualquier cambio en cómo se siente después.

EPKINLY puede causar efectos secundarios graves, incluidos el síndrome de liberación de citocinas (llamado SLC), que es frecuente durante el tratamiento con EPKINLY y puede ser grave o potencialmente mortal, y problemas neurológicos que pueden ser potencialmente mortales y provocar la muerte. Otros efectos secundarios graves incluyen infecciones, que pueden ser graves y provocar la muerte, y recuentos bajos de células sanguíneas, que pueden ser graves o intensos.

Esté atento a los síntomas del SLC

Los síntomas de SLC pueden ser los siguientes:

- Fiebre de 100.4 °F (38 °C) o más
- Mareos o aturdimiento
- Dificultad para respirar
- Escalofríos
- Latidos cardíacos rápidos
- Sensación de ansiedad
- Dolor de cabeza
- Confusión
- Temblores (estremecimientos)
- Problemas con el equilibrio y el movimiento, como problemas para caminar

Informe de inmediato a su proveedor de atención médica o busque ayuda médica si presenta algún síntoma de SLC. Su proveedor de atención médica puede administrarle medicamentos para tratar sus efectos secundarios. Su proveedor de atención médica puede interrumpir de forma temporal o completa su tratamiento con EPKINLY, dependiendo de sus síntomas.



Consejo para los socios de atención: Vigile a su ser querido para detectar signos de fiebre. Utilice un termómetro para comprobar con frecuencia si hay fiebre de 100.4 °F (38 °C) o más en los días posteriores a la inyección de EPKINLY. Anote la temperatura de su ser querido en el registro de Seguimiento del tratamiento, en las páginas 18-23 y **avise al equipo de atención médica si su temperatura es de 100.4 °F (38 °C) o más después del tratamiento.**

Recuerde llevar con usted su **tarjeta de bolsillo** por si un proveedor de atención médica necesita tener acceso rápido a información sobre su tratamiento con EPKINLY.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD ESPECÍFICA

Entre los efectos secundarios más frecuentes de EPKINLY cuando se usa solo en el FL se encuentran el SLC, las reacciones en el lugar de inyección, el cansancio, el dolor muscular y óseo, la fiebre, la diarrea, el COVID-19, la erupción y el dolor en la zona del estómago (abdominal). **Los resultados anómalos graves más frecuentes en los análisis de laboratorio con EPKINLY cuando se usa solo** incluyen disminución de los glóbulos blancos, disminución de los glóbulos rojos y disminución de las plaquetas.

Consulte la Información importante de seguridad, incluidas las Advertencias importantes sobre el SLC y los problemas neurológicos, en las páginas 8-9. Consulte la [Guía del medicamento](#).

epkinly[®]
epcoritamab-bysp
SUBCUTANEOUS INJECTION 4mg/48mg

Esté atento a los síntomas de problemas neurológicos

Pueden producirse problemas neurológicos días o semanas después de recibir EPKINLY. Su proveedor de atención médica puede derivarlo a alguien especializado en problemas neurológicos.

Los síntomas pueden incluir, entre otros:

- Problemas para hablar o escribir
- Confusión y desorientación
- Somnolencia
- Cansancio o falta de energía
- Debilidad muscular
- Temblores (estremecimientos)
- Convulsiones
- Pérdida de memoria

Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si presenta algún síntoma de problemas neurológicos. Es posible que se le administren medicamentos para tratar sus efectos secundarios, y su tratamiento con EPKINLY puede interrumpirse de forma temporal o completa.



Consejo para los socios de atención: Los problemas neurológicos pueden afectar la capacidad de su ser querido para pensar, recordar o usar el lenguaje (verbal o escrito). Estos pueden ser sutiles o difíciles de observar al principio. Si observa algún cambio en el comportamiento de su ser querido, informe al equipo de atención médica inmediatamente.

Otras cosas importantes que debe saber

No conduzca, opere o use maquinaria pesada ni realice otras actividades peligrosas si presenta mareos, confusión, temblores, somnolencia o cualquier otro síntoma que altere la consciencia hasta que los signos y síntomas desaparezcan. Estos pueden ser signos y síntomas de SLC o problemas neurológicos.

Esté atento a los síntomas de infección. Su proveedor de atención médica lo controlará para detectar signos y síntomas de infección antes y durante el tratamiento, y lo tratará según sea necesario si desarrolla una infección. Debe recibir medicamentos de su proveedor de atención médica antes de iniciar el tratamiento para ayudar a prevenir infecciones.

Los posibles efectos secundarios que puede experimentar con EPKINLY incluyen, entre otros: fiebre de 100.4 °F (38 °C) o más; tos; dolor torácico; cansancio; falta de aliento; erupción dolorosa; dolor de garganta; dolor al orinar; sensación de debilidad o malestar general; confusión; formación de hematomas, y problemas hemorrágicos.

Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si presenta alguno de estos síntomas. Su proveedor de atención médica puede interrumpir de forma temporal o completa su tratamiento con EPKINLY. Estos no son todos los efectos secundarios posibles de EPKINLY. Llame a su médico para recibir asesoría médica acerca de los efectos secundarios.

Consulte la Información importante de seguridad, incluidas las Advertencias importantes sobre el SLC y los problemas neurológicos, en las páginas 8-9. Consulte la [Guía del medicamento](#).


epcoritamab-bysp[®]
SUBCUTANEOUS INJECTION 4mg/48mg

MyNavCare Patient Support[®] está aquí para ayudarlo



Con *MyNavCare*, puede recibir apoyo personalizado durante su tratamiento con EPKINLY a través de un equipo dedicado que se preocupa



Un socio durante su tratamiento con EPKINLY

Su proveedor de atención médica es su principal fuente de información sobre el tratamiento. Con *MyNavCare*, tiene acceso a recursos adicionales e información sobre medicamentos.

- Asistencia especializada durante todo el tratamiento
- Información sobre el acceso al tratamiento y apoyo financiero*
- Conocimiento de organizaciones independientes que pueden proporcionar asistencia adicional
- Herramientas y recursos adicionales que pueden ayudar en el camino



Asistencia financiera para pacientes elegibles

MyNavCare puede ayudar a los pacientes sin seguro o con seguro insuficiente a recibir asistencia e información financiera. Esto incluye lo siguiente:

- Programa de asistencia de copago para pacientes con seguro comercial*
- Información de la fundación del asistente de pacientes independiente†
- Programa de asistencia para pacientes de Genmab



Apoyo continuo personalizado

Su **coordinador de enlace con el paciente**‡ es un enfermero con experiencia, capacitado sobre el apoyo del tratamiento en lo que respecta a su atención específica. Está dedicado a usted, lo ayuda a:

- Proporcionar información general sobre su afección
- Conectarle con organizaciones externas que pueden ayudarle
- Ofrecer recursos para usted y sus socios de atención

*Basado en los requisitos de elegibilidad y los términos y condiciones. Los pacientes del programa federal de atención médica (Federal health care program, FHCP) no son elegibles para recibir el apoyo de copagos de *MyNavCare*.

†Los requisitos de elegibilidad los determina cada fundación externa independiente. *MyNavCare* no determina elegibilidad y no se puede garantizar que las fundaciones ofrezcan asistencia.

‡Los coordinadores de enlace con el paciente son proporcionados por *MyNavCare Patient Support*[®] y no trabajan bajo la dirección de su médico ni proporcionan asesoramiento médico. Los pacientes deben hablar con su médico sobre cualquier pregunta relacionada con el tratamiento.

Póngase en contacto con un especialista en asistencia de *MyNavCare* llamando al 1-866-NAV-CARI (1-866-628-2271), de lunes a viernes, de 8:00 A. M. a 8:00 P. M., hora del este. También puede escanear el código QR o visitar www.MyNavCare.com para obtener más información.



Consulte la Información importante de seguridad, incluidas las Advertencias importantes sobre el SLC y los problemas neurológicos, en las páginas 8-9. Consulte la Guía del medicamento.

epkinly[®]
epcoritamab-bysp
SUBCUTANEOUS INJECTION 4mg/48mg

Recursos adicionales

Apoyo para usted y su socio de atención

Estas son algunas organizaciones que pueden ayudar a los pacientes y a los socios de atención a conectarse con otras personas, y proporcionarles información y recursos durante todo el tratamiento.



CancerCare

www.cancercares.org | 800-813-HOPE (4673)



American Cancer Society

www.cancer.org | 800-227-2345



Lymphoma Research Foundation

www.lymphoma.org | 800-500-9976



Blood Cancer United

www.bloodcancerunited.org | 800-955-4572



Family Reach

www.familyreach.org | 857-233-2764



Follicular Lymphoma Foundation

www.theflf.org | info@theflf.org

Hay muchos recursos disponibles que pueden ser útiles para los pacientes, las familias y los socios de atención que afrontan el cáncer. Los recursos anteriores no están controlados por Genmab/AbbVie, no son de su propiedad ni están respaldados por ellos, y Genmab/AbbVie no es responsable de su contenido.

Consulte la Información importante de seguridad, incluidas las Advertencias importantes sobre el SLC y los problemas neurológicos, en las páginas 8-9. Consulte la [Guía del medicamento](#).





Si usted es un socio de atención

Como socio de atención, se ha convertido en parte integral del equipo de atención médica de su ser querido.

Algunas responsabilidades que puede asumir durante el tratamiento de su ser querido:



Toma de decisiones: Investigar ensayos clínicos y opciones de tratamiento, ayudar a considerar las opciones de tratamiento y defender a su ser querido



Emocional: Motivarlos a compartir sus sentimientos y ayudarles a que se sientan apoyados



Apoyo con el tratamiento: Ayudarlos a detectar posibles efectos secundarios, asistir a las citas y asegurarse de que tengan lo que necesitan durante todos sus tratamientos



Logística: Programar y llevarles a las citas, hacer recados y ayudar con sus necesidades diarias

Consulte la Información importante de seguridad, incluidas las Advertencias importantes sobre el SLC y los problemas neurológicos, en las páginas 8-9. Consulte la [Guía del medicamento](#).


epcoritamab-bysp[®]
SUBCUTANEOUS INJECTION 4mg/48mg



Anote la información importante aquí

Registre su experiencia con EPKINLY y R² y compártala con su equipo de atención médica para que se haga una idea completa de cómo se encuentra con el tratamiento.

- Mantenga un seguimiento de la fecha de la cita para cada dosis de EPKINLY
- Marque la ubicación del lugar de inyección de EPKINLY
- Registre la temperatura según las instrucciones de su equipo de atención médica
- Anote cómo se siente después del tratamiento y cualquier otra información que desee compartir

Inyección de EPKINLY:



Ubicación

Dosis: _____

Fecha: _____

Hora: _____

Infusión de rituximab:

Fecha: _____

Hora: _____

Mi temperatura:

Temperatura: _____ Fecha: _____ Hora: _____

Temperatura: _____ Fecha: _____ Hora: _____

Temperatura: _____ Fecha: _____ Hora: _____

Cómo me siento: _____

Preguntas/notas para mi equipo de atención médica: _____

Estos son algunos consejos para no olvidarse de tomar el comprimido de lenalidomide:

- Configure una alarma o un recordatorio para el medicamento en su teléfono.
- Acostúmbrese a tomar el comprimido durante una actividad que haga a la misma hora todos los días, como cepillarse los dientes o comer.
- Utilice el calendario de las siguientes páginas para llevar un registro del medicamento.


Consulte la Información importante de seguridad, incluidas las Advertencias importantes sobre el SLC y los problemas neurológicos, en las páginas 8-9. Consulte la [Guía del medicamento](#).



Seguimiento del tratamiento

Seguimiento del
tratamiento

Inyección de EPKINLY:



Ubicación

Dosis: _____

Fecha: _____

Hora: _____

Infusión de rituximab:

Fecha: _____

Hora: _____

Mi temperatura:

Temperatura: _____ Fecha: _____ Hora: _____


Temperatura: _____ Fecha: _____ Hora: _____

Temperatura: _____ Fecha: _____ Hora: _____

Cómo me siento: _____

Preguntas/notas para mi equipo de atención médica: _____

Inyección de EPKINLY:



Ubicación

Dosis: _____

Fecha: _____

Hora: _____

Infusión de rituximab:

Fecha: _____

Hora: _____

Mi temperatura:

Temperatura: _____ Fecha: _____ Hora: _____

Temperatura: _____ Fecha: _____ Hora: _____

Temperatura: _____ Fecha: _____ Hora: _____

Cómo me siento: _____

Preguntas/notas para mi equipo de atención médica: _____

Consulte la Información importante de seguridad, incluidas las Advertencias importantes sobre el SLC y los problemas neurológicos, en las páginas 8-9. Consulte la [Guía del medicamento](#).



epcoritamab-bysp[®]
SUBCUTANEOUS INJECTION 4mg/48mg



Seguimiento del tratamiento

Seguimiento del
tratamiento

Inyección de EPKINLY:



Ubicación

Dosis: _____

Fecha: _____

Hora: _____

Infusión de rituximab:

Fecha: _____

Hora: _____

Mi temperatura:

Temperatura: _____ Fecha: _____ Hora: _____

Temperatura: _____ Fecha: _____ Hora: _____

Temperatura: _____ Fecha: _____ Hora: _____

Cómo me siento: _____

Preguntas/notas para mi equipo de atención médica: _____

Inyección de EPKINLY:



Ubicación

Dosis: _____

Fecha: _____

Hora: _____

Infusión de rituximab:

Fecha: _____

Hora: _____

Mi temperatura:

Temperatura: _____ Fecha: _____ Hora: _____

Temperatura: _____ Fecha: _____ Hora: _____

Temperatura: _____ Fecha: _____ Hora: _____

Cómo me siento: _____

Preguntas/notas para mi equipo de atención médica: _____

Consulte la Información importante de seguridad, incluidas las Advertencias importantes sobre el SLC y los problemas neurológicos, en las páginas 8-9. Consulte la [Guía del medicamento](#).



epcoritamab-bysp[®]
SUBCUTANEOUS INJECTION 4mg/48mg



Seguimiento del tratamiento

Seguimiento del
tratamiento

Inyección de EPKINLY:



Ubicación

Dosis: _____

Fecha: _____

Hora: _____

Infusión de rituximab:

Fecha: _____

Hora: _____

Mi temperatura:

Temperatura: _____ Fecha: _____ Hora: _____

Temperatura: _____ Fecha: _____ Hora: _____

Temperatura: _____ Fecha: _____ Hora: _____

Cómo me siento: _____

Preguntas/notas para mi equipo de atención médica: _____

Inyección de EPKINLY:



Ubicación

Dosis: _____

Fecha: _____

Hora: _____

Infusión de rituximab:

Fecha: _____

Hora: _____

Mi temperatura:

Temperatura: _____ Fecha: _____ Hora: _____

Temperatura: _____ Fecha: _____ Hora: _____

Temperatura: _____ Fecha: _____ Hora: _____

Cómo me siento: _____

Preguntas/notas para mi equipo de atención médica: _____

Consulte la Información importante de seguridad, incluidas las Advertencias importantes sobre el SLC y los problemas neurológicos, en las páginas 8-9. Consulte la [Guía del medicamento](#).



epcoritamab-bysp[®]
SUBCUTANEOUS INJECTION 4mg/48mg



Seguimiento del tratamiento

Seguimiento del
tratamiento

Inyección de EPKINLY:



Ubicación

Dosis: _____

Fecha: _____

Hora: _____

Infusión de rituximab:

Fecha: _____

Hora: _____

Mi temperatura:

Temperatura: _____ Fecha: _____ Hora: _____


Temperatura: _____ Fecha: _____ Hora: _____

Temperatura: _____ Fecha: _____ Hora: _____

Cómo me siento: _____

Preguntas/notas para mi equipo de atención médica: _____

Inyección de EPKINLY:



Ubicación

Dosis: _____

Fecha: _____

Hora: _____

Infusión de rituximab:

Fecha: _____

Hora: _____

Mi temperatura:

Temperatura: _____ Fecha: _____ Hora: _____

Temperatura: _____ Fecha: _____ Hora: _____

Temperatura: _____ Fecha: _____ Hora: _____

Cómo me siento: _____

Preguntas/notas para mi equipo de atención médica: _____

Consulte la Información importante de seguridad, incluidas las Advertencias importantes sobre el SLC y los problemas neurológicos, en las páginas 8-9. Consulte la [Guía del medicamento](#).



epcoritamab-bysp[®]
SUBCUTANEOUS INJECTION 4mg/48mg



Seguimiento del tratamiento

Seguimiento del
tratamiento

Inyección de EPKINLY:



Ubicación

Dosis: _____

Fecha: _____

Hora: _____

Infusión de rituximab:

Fecha: _____

Hora: _____

Mi temperatura:

Temperatura: _____ Fecha: _____ Hora: _____

Temperatura: _____ Fecha: _____ Hora: _____

Temperatura: _____ Fecha: _____ Hora: _____

Cómo me siento: _____

Preguntas/notas para mi equipo de atención médica: _____

Inyección de EPKINLY:



Ubicación

Dosis: _____

Fecha: _____

Hora: _____

Infusión de rituximab:

Fecha: _____

Hora: _____

Mi temperatura:

Temperatura: _____ Fecha: _____ Hora: _____

Temperatura: _____ Fecha: _____ Hora: _____

Temperatura: _____ Fecha: _____ Hora: _____

Cómo me siento: _____

Preguntas/notas para mi equipo de atención médica: _____

Consulte la Información importante de seguridad, incluidas las Advertencias importantes sobre el SLC y los problemas neurológicos, en las páginas 8-9. Consulte la [Guía del medicamento](#).


epcoritamab-bysp[®]
SUBCUTANEOUS INJECTION 4mg/48mg

Utilice este calendario para hacer un seguimiento de sus citas de atención de la salud e incluya los tratamientos (inyecciones, infusiones y comprimidos) y las pruebas. Tome notas aquí antes de la cita si tiene preguntas para su proveedor de atención médica.



epkinly[®]
epcoritamab-bysp
SUBCUTANEOUS INJECTION 4mg/48mg



Calendario

Calendario
de citas

MES:

DOM.	LUN.	MAR.	MIÉ.	JUE.	VIE.	SÁB.

Consulte la Información importante de seguridad, incluidas las Advertencias importantes sobre el SLC y los problemas neurológicos, en las páginas 8-9. Consulte la [Guía del medicamento](#).


epkinly[®]
epcoritamab-bysp
SUBCUTANEOUS INJECTION 4mg/48mg



Calendario

MES:

DOM.	LUN.	MAR.	MIÉ.	JUE.	VIE.	SÁB.

Consulte la Información importante de seguridad, incluidas las Advertencias importantes sobre el SLC y los problemas neurológicos, en las páginas 8-9. Consulte la [Guía del medicamento](#).



Calendario

MES:

DOM.	LUN.	MAR.	MIÉ.	JUE.	VIE.	SÁB.

Consulte la Información importante de seguridad, incluidas las Advertencias importantes sobre el SLC y los problemas neurológicos, en las páginas 8-9. Consulte la [Guía del medicamento](#).



Calendario

MES:

DOM.	LUN.	MAR.	MIÉ.	JUE.	VIE.	SÁB.

Consulte la Información importante de seguridad, incluidas las Advertencias importantes sobre el SLC y los problemas neurológicos, en las páginas 8-9. Consulte la [Guía del medicamento](#).



Calendario

MES:

DOM.	LUN.	MAR.	MIÉ.	JUE.	VIE.	SÁB.

Consulte la Información importante de seguridad, incluidas las Advertencias importantes sobre el SLC y los problemas neurológicos, en las páginas 8-9. Consulte la [Guía del medicamento](#).



Calendario

MES:

DOM.	LUN.	MAR.	MIÉ.	JUE.	VIE.	SÁB.

Consulte la Información importante de seguridad, incluidas las Advertencias importantes sobre el SLC y los problemas neurológicos, en las páginas 8-9. Consulte la [Guía del medicamento](#).



Calendario

MES:

DOM.	LUN.	MAR.	MIÉ.	JUE.	VIE.	SÁB.

Consulte la Información importante de seguridad, incluidas las Advertencias importantes sobre el SLC y los problemas neurológicos, en las páginas 8-9. Consulte la [Guía del medicamento](#).



Calendario

MES:

DOM.	LUN.	MAR.	MIÉ.	JUE.	VIE.	SÁB.

Consulte la Información importante de seguridad, incluidas las Advertencias importantes sobre el SLC y los problemas neurológicos, en las páginas 8-9. Consulte la [Guía del medicamento](#).



Calendario

MES:

DOM.	LUN.	MAR.	MIÉ.	JUE.	VIE.	SÁB.

Consulte la Información importante de seguridad, incluidas las Advertencias importantes sobre el SLC y los problemas neurológicos, en las páginas 8-9. Consulte la [Guía del medicamento](#).



Calendario

MES:

DOM.	LUN.	MAR.	MIÉ.	JUE.	VIE.	SÁB.

Consulte la Información importante de seguridad, incluidas las Advertencias importantes sobre el SLC y los problemas neurológicos, en las páginas 8-9. Consulte la [Guía del medicamento](#).



Calendario

MES:

DOM.	LUN.	MAR.	MIÉ.	JUE.	VIE.	SÁB.

Consulte la Información importante de seguridad, incluidas las Advertencias importantes sobre el SLC y los problemas neurológicos, en las páginas 8-9. Consulte la [Guía del medicamento](#).



Calendario

MES:

DOM.	LUN.	MAR.	MIÉ.	JUE.	VIE.	SÁB.
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Consulte la Información importante de seguridad, incluidas las Advertencias importantes sobre el SLC y los problemas neurológicos, en las páginas 8-9. Consulte la [Guía del medicamento](#).

Preguntas y notas

Anote las preguntas que pueda tener antes o durante su cita con su proveedor de atención médica. También puede utilizar este espacio para tomar notas.

[illegible]

Consulte la Información importante de seguridad, incluidas las Advertencias importantes sobre el SLC y los problemas neurológicos, en las páginas 8-9. Consulte la Guía del medicamento.



Información de contacto importante

Escriba la información de contacto de los miembros de su equipo de atención médica y otros contactos de emergencia para un acceso rápido y fácil.

Mi médico

Nombre: _____

Número de teléfono: _____

Dirección del consultorio: _____

Mi personal de enfermería

Nombre: _____

Número de teléfono: _____

Dirección del consultorio: _____

Nombre: _____

Número de teléfono: _____

Dirección del consultorio: _____

Mi farmacia

Nombre: _____

Número de teléfono: _____

Dirección de la farmacia: _____

Mi contacto de emergencia

Nombre: _____

Número de teléfono: _____

Si nota algún efecto secundario o síntomas inusuales, comuníquese con su equipo de atención médica de inmediato.



También es una buena idea guardar esta información en su teléfono móvil. Incluso puede tomar una foto de esta página.

Consulte la Información importante de seguridad, incluidas las Advertencias importantes sobre el SLC y los problemas neurológicos, en las páginas 8-9. Consulte la Guía del medicamento.


epcoritamab-bysp[®]
SUBCUTANEOUS INJECTION 4mg/48mg



Escanee el código QR o visite
EPKINLY.com/2L-FL para obtener
más información



Retratos de actores.

Consulte la Información importante de seguridad, incluidas las Advertencias importantes sobre el SLC y los problemas neurológicos, en las páginas 8-9. Consulte la [Guía del medicamento](#).



Distribuido y comercializado por Genmab US Inc. 777 Scudders Mill Road, Plainsboro, NJ 08536.
Distribuido y comercializado por AbbVie Inc. 1 North Waukegan Road, North Chicago, IL 60064.
EPKINLY y MyNavCare Patient Support son marcas comerciales de Genmab A/S.
Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
©2026 Genmab A/S y AbbVie. Todos los derechos reservados.
05/2026 COM-US-EPK-0002718

epkinly[®]
epcoritamab-bysp
SUBCUTANEOUS INJECTION 4mg/48mg